FOLPAN 50 WP

COMMERCIAL

A wettable powder fungicide for the control of a number of fungus diseases on certain fruit, vegetables, ornamental and other crops.

REGISTRATION NO. 15654
PEST CONTROL PRODUCTS ACT
GUARANTEE: Folpet 50%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

READ THE LABEL BEFORE USING
Causes eye irritation.
May be harmful if swallowed or inhaled.
Store in cool, dry place - Protect from excessive heat.

WARNING: Directions for use and cautionary statements should be carefully followed. Read the label before using.

DIRECTIONS FOR USE

FOLPAN 50 WP is a wettable powder fungicide which can be combined with most commonly used insecticides, adjuvants and fungicides. Use only on crops listed on this label.

PRECAUTIONS

Check compatibilities of combination before making tank mixes unless previous use of the materials being combined has been proven to be physically compatible. Fungicidal activity is reduced if combined with strongly alkaline materials such as hydrated lime. This material should not be used in combination with or closely following an oil spray.

DIRECTIONS FOR USE

Fill spray tank nearly full and pour recommended amount of Folpan on surface of water. Fungicide can be premixed in a bucket half filled with water. Mix can be poured through screen into nearly filled spray tank. Finish filling tank. Keep agitator running during filling and spraying. Do not allow solution to stand without agitation. Do not use in low volume gear-type equipment.

RECOMMENDATIONS

Dosage rates unless otherwise specified are given in terms of kg FOLPAN (Folpet) 50 WP per 1000 litres of water.

APPLES, CRABAPPLES-alternaria leaf spot, black rot, brooks spot, fly-speck, scab, sooty blotch: Use 1.5-2.0 kg in 1000 litres. Apply in a regular protective schedule from green tip up until harvest.

EASTERN CANADA: Treatments during the critical period (just before bloom until 30 days after petal fall) may cause russetting to sensitive varieties such as Golden Delicious, Red Delicious and Stayman Winesap.

WESTERN CANADA: Do not use between bloom and July to avoid injury. Do not apply within 1 day of harvest.

GRAPES-dead arm: Use 2.0 kg in 1000 litres. Apply when new shoots are 2.5 to 5.0 cm long and repeat when growth is 10 to 15 cm long. Do not apply within 1 day of harvest.
Black rot, downy mildew: Use 2.0 kg in 1000 litres. Apply just before bloom, just after bloom, and in first cover spray. For downy mildew, an additional application 2 to 3 weeks later may be needed. Do not apply within 1 day of harvest.
Powdery mildew: Use 2.0 kg in 1000 litres. Apply 2 to 3 weeks after bloom and repeat at 2 week intervals as needed. Do not apply within 1 day of harvest.

STRAWBERRIES-gray mold, fruit rot, leaf spot: Use 2.0 kg in 1000 litres. Use up to 2000 litres per hectare. Apply before first infection and repeat at 7-day intervals to protect crop until harvest. Do not apply within 1 day of harvest.

CRANBERRIES-fruit rot: Use 10 kg per hectare. Apply when 5% of blossoms are open. Repeat 10 to 14 days later when 50 to 75% of blossoms are open. Apply up to 2000 litres per hectare. Do not apply within 30 days of harvest.

CUCUMBERS, MELONS, PUMPKINS, SQUASH-anthracnose, downy mildew, powdery mildew: Use 2.0-4.0 kg in 1000 litres. Apply when first true leaves appear. Repeat at 7-day intervals until crop is harvested. Apply up to 2000 litres per hectare depending on size of vines. Do not apply within 1 day of harvest.

TOMATOES-anthracnose: Use 4.0 kg in 1000 litres. Apply during first bloom and repeat at 7-day intervals until harvest. Apply up to 2000 litres per hectare. Do not apply within 1 day of harvest.

ROSES-mildew: Use 2.0 kg in 1000 litres. Apply when young leaves first appear. Repeat at intervals of 7 to 10 days or as necessary.

CARNATIONS-blight (alternaria leaf spot): Use 2 kg in 1000 litres. Apply 2 weeks after planting and treat 3 or 4 times at bi-weekly intervals.

POINSETTIAS (GREENHOUSE)-pythium root rot: Use 2.0 to 2.25 kg in 1000 litres. Apply at time of planting. Use 0.57 litres per 20 cm pan. Repeat in 10 days.

AZALEAS-stem rot of cuttings: Use 1.5 to 3.0 kg in 1000 litres. Soak cuttings for 15 to 30 minutes before planting.

MARIGOLDS, ZINNIAS-alternaria leaf spot: Use 2.0 kg in 1000 litres. Apply when plants emerge and repeat at intervals of 3 to 7 days. Use the higher frequency during periods of rapid new growth and severe risk of infection caused by rains or high humidity.

ASTERS, CHINA ASTERS, PHLOXES-powdery mildew: Use 2.0 kg in 1000 litres. Apply before disease appears and repeat at intervals of 7 to 10 days. Increase frequency during periods of rapid new growth and severe risk of infection caused by rains or high humidity.

CHRYSANTHEMUMS-powdery mildew, septoria leaf spot: Use 2.0 kg in 1000 litres. Apply immediately after planting and repeat at intervals of 7 to 10 days. Increase frequency during periods of rapid new growth and severe risk of infection caused by rains and high humidity.

IRIS-didymellina leaf spot: Use 2.0 kg in 1000 litres. Apply when plants emerge and repeat at intervals of 7 to 10 days.

SNAPDRAGON-anthracnose, powdery mildew: Use 2.0 kg in 1000 litres. Apply when plants emerge and repeat at intervals of 3 to 7 days. Use higher frequency during periods of rapid new growth and severe risk of infection caused by rains or high humidity.

PRECAUTIONS

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Store in a cool, dry, ventilated place, away from feeds and foods. Keep away from heat, fire and sparks. May irritate eyes, nose, throat, and skin. May cause skin irritation or sensitization; avoid repeated skin contact. Avoid contact with skin, eyes, and clothing. Wash thoroughly after handling and before eating, drinking, or smoking. Wash contaminated clothing with soap and hot water before reuse. Avoid breathing dust or spray mist. Do not contaminate food or feed. Do not contaminate any body of water.

FIRST AID

In case of poisoning, call a physician immediately.
IF ON SKIN: Remove contaminated clothing and wash skin thoroughly with soap and water.
IF IN EYES: Flush with water for 15 minutes and obtain medical attention.
IF SWALLOWED: Give patient one to two glasses of water and cause vomiting by inserting a finger down the throat. Repeat until the vomit fluid is clear. Obtain medical attention,or contact a poison control centre. Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.

DISPOSAL

1. Follow provincial instructions for any required additional cleaning of the container, prior to its disposal.
2. Make the empty container unsuitable for further use.
3. Dispose of the container in accordance with provincial requirements.
4. For information on the disposal of unused, unwanted product, contact the manufacturer or the provincial regulatory agency. Contact the manufacturer and the provincial regulatory agency in case of a spill, and for cleanup of spills.

NOTICE TO USER: This control product is to be used only in accordance with the directions on this label. It is an offense under the *Pest Control Product Act* to use a control product under unsafe conditions.

NOTICE TO BUYER: Seller's guarantee shall be limited to the terms set out on the label, and subject thereto the buyer assumes the risk to persons or property arising from the use or handling of the product and accepts the product on that condition.

MAKHTESHIM-AGAN OF NORTH AMERICA INC.
551 Fifth Avenue, Suite 1100
New York, NY 10176
U.S.A.

8616

(01) 0 06 23111 00284 0

COMMERCIAL

Un fongicide en poudre mouillable pour la répression d'un bon nombre de maladies fongiques sur certaines cultures de fruits, de légumes, de plantes ornementales et autres.

NO D'HOMOLAGATION 15654
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
GARANTIE: Folpète 50%

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
Cause une irritation des yeux.
Peut être nocif s'il est avalé ou inhalé.
Entreposer dans un endroit frais et sec - Protéger contre toute chaleur excessive.

AVERTISSEMENT: Il faut suivre attentivement le mode d'emploi et les précautions. Lire l'etiquette avant l'emploi.

MODE D'EMPLOI

Le Folpan 50 WP est un fongicide en poudre mouillable qu'on peut combiner à la plupart des insecticides, adjuvants et fongicides en usage courant. Employer uniquement sur les cultures qui sont stipulées sur cette étiquette.

MISES EN GARDE

Vérifier la compatibilité de toute combinaison de pesticides avant de préparer un mélange en réservoir, à moins qu'un usage antérieur des mêmes substances ensemble ait démontré qu'elles étaient physiquement compatibles. L'activité fongicide du produit est réduite s'il est combiné à une substance fortement alcaline comme la chaux hydratée. Ce produit ne devrait pas être utilisé avec ou immédiatement après une pulvérisation d'huile.

MODE D'EMPLOI

Remplir presque complètement le réservoir du pulvérisateur et verser la quantité recommandée de Folpan sur la surface de l'eau. Le fongicide peut être mélangé d'avance dans un seau à moitié rempli d'eau. Ce mélange est ensuite versé à travers un tamis dans le réservoir presque rempli du pulvérisateur Finir de remplir le réservoir. Garder l'agitateur en marche durant le remplissage et la pulvérisation. Ne pas laisser la solution immobile sans agitation. Ne pas utiliser dans un appareil de type à engrenages à faible volume.

RECOMMANDATIONS

À moins d'indication contraire, les doses sont données en kilogrammes de Folpan (Folpète) 50 WP par 1000 litres d'eau.

POMMES, POMMETTES - alternariose, pourriture noire, tache phoméenne, moucheture, tavelure, tache de suie: Employer 1,5 à 2,0 kg dans 1000 litres d'eau. Appliquer dans le cadre d'un programme régulier de protection à partir du débourrement jusqu'à la cueillette.

EST DU CANADA: Les traitements effectués durant la période critique (juste avant la floraison jusqu'à 30 jours après la chute des pétales) peuvent causer une rorussissure sur des variétés sensibles telles que Golden Delicious, Red Delicious et Stayman Winesap.

OUEST DU CANADA: Ne pas employer entre la floraison et le mois de juillet, afin d'éviter des dommages. Ne pas appliquer moins d'un jour avant la cueillette.

RAISINS - branche moribonde: Employer 2,0 kg dans 1000 litres d'eau. Appliquer lorsque les nouvelles pousses mesurent de 2,5 à 5,0 cm de longueur, et répéter lorsque la croissance atteint 10 à 15 cm. Ne pas appliquer moins d'un jour avant les vendanges.
Pourriture noire, mildiou: Employer 2,0 kg dans 1000 litres d'eau. Appliquer juste avant la floraison, juste après la floraison et dans la première pulvérisation de couverture. Pour combattre le mildiou, un traitement additionnel 2 à 3 semaines plus tard pourrait être nécessaire. Ne pas appliquer moins d'un jour avant les vendanges.
Blanc: Employer 2,0 kg dans 1000 litres d'eau. Appliquer 2 à 3 semaines après la floraison et répétér à des intervalles de 2 semaines selon les besoins. Ne pas appliquer moins d'un jour avant les vendanges.

FRAISES - moisissure grise, tache des feiulles: Employer 2,0 kg dans 1000 litres d'eau. L'utiliser jusqu'à 2000 litres de mélange par hectare. Appliquer avant l'infection initiale et répéter à des intervalles de 7 jours pour protéger les fraises jusqu'à la cueillette. Ne pas appliquer moins de 1 jour avant la cueillette.

CANNEBERGES (ATOCAS) - pourriture des baies: Employer 10 kg par hectare. Appliquer lorsque 5% des fleurs sont ouvertes. Répéter à des intervalles de 10-14 jours plus tard lorsque 50-75% des fleurs sontes ouvertes. Appliquer jusqu'à 2000 litres de mélange par hectare. Ne pas appliquer moins de 30 jours avant la cueillette.

CONCOMBRES, MELONS, CITROUILLES, COURGES - anthracnose, mildiou, blanc: Employer 2,0 à 4,0 kg dans 1000 litres d'eau. Appliquer jusqu'à 2000 litres de mélange par hectare, selon les dimensions des sarments. Ne pas appliquer moins d'un jour avant la cueillette.

TOMATOES - anthracnose: Employer 4,0 kg dans 1000 litres d'eau. Appliquer durant la première floraison et répéter à des intervalles de 7 jours jusqu'à la cueillette. Appliquer jusqu'à 2000 litres de mélange par hectare. Ne pas appliquer moins d'un jour avant la récolte.

ROSES - mildiou: Employer 2,0 kg dans 1000 litres d'eau. Appliquer dès l'apparition des jeunes feuilles. Répéter à des intervalles de 7 à 10 jours ou selon les besoins.

OEILLETS - brûlure alternarienne: Employer 2,0 kg dans 1000 litres d'eau. Appliquer 2 semaines après la mise en terre et traiter 3 ou 4 fois à des intervalles de deux semaines.

POINSETTIES (DE SERRE) - pourriture des racines: Employer 2,0 à 2,25 kg dans 1000 litres d'eau. Appliquer au moment de la mise en terre. Utiliser 0,57 litre de mélange par pot de 20 cm. Répéter 10 jours plus tard.

AZALÉES - pourridié des boutures: Employer 1,5 à 3,0 kg dans 1000 litres d'cau. Faire tremper les boutures pendant 15 à 30 mintures avant de les planter.

TAGÈTES, ZINNIAS - tache foliaire alternarienne: Employer 2,0 kg dans 1000 litres d'eau. Appliquer lorsque les plants sortent de terre et répéter à des intervalles de 3 à 7 jours. Adopter l'intervalle réduit durant des périodes de nouvelle croissance rapide et de graves risques d'infection occasionnés par des pluis ou une humidité élevée.

ASTERS, REINES MARGUERITES, PHILOX - blanc: Employer 2,0 kg dans 1000 litres d'eau. Appliquer avant l'apparition de la maladie et répéter à des intervalles de 7 à 10 jours. Accroîître la fréquence des traitements durant des périodes de nouvelles croissance rapide et de graves risques d'infection occasionnés par des pluies ou une humidité élevée.

CHRYSANTHÈMES - blanc, tache septorienne: Employer 2,0 kg dans 1000 litres d'eau. Appliquer immédiatement après la mise en terre et répéter à des intervalles de 7 à 10 jours. Accroître la fréquence durant des périodes de nouvelle croissance rapide et de graves risques d'infection occasionnés par des pluies ou une humidité élevée.

IRIS - tachc hétérosporienne: Employer 2,0 kg dans 1000 litres d'eau. Appliquer lorsque les plants sortent de terre et répéter à des intervalless de 7 à 10 jours.

MUFLIERS - anthracnose : Employer 2,0 kg dans 1000 litres d'eau. Appliquer lursque les plants sortent de terre et répéter à des intervalles de 3 à 7 jours. Adapter l'intervalle réduit durant des périodes de nouvelle croissance rapide et de graves risques d'infection causés par des pluies ou une humidité élevée.

PRÉCAUTIONS

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Entreposer dans un endroit frais, sec et aéré, à l'écart des aliments et des moulées. Garder à une distance prudente de la chaleur, du feu et des étincelles. Peut irriter lex yeux, le nez, la gorge et la peau. Peut causer une irritation ou sensibilisation de la peau; éviter tout contact répété du produit avec la peau. Éviter de respirer le broillard de pulvérisation ou la poussière du produit. Ne pas contaminer les aliments ou les moulées. Ne jamais contaminer aucune étendue d'eau.

PREMIERS SOINS

En cas de contact avec la peau, enlever les vêtements contaminés et laver parfaitement la peau avec du savon et de l'eau.
En cas de contact avec lea yeux, les rincer à grande eau pendant 15 minutes et recourir à des soins médicaux.
En cas d'ingestion, donner un ou deux verres d'eau à la personne incommodée et la faire vomir en insérant un doigt dans sa gorge.
Répéter jusqu'à ce que le liquide vomi soit clair. Reccurir à des soins médicaux, ou contacte une centre anti-poison.
Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numero d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

ÉLIMINATION

1. Suivre les instructions provinciales pour tout nettoyage additionnel nécessaire du récipient avant on élimination.
2. Rendre le récipient vide impropre à tout usage additionnel.
3. Éliminer le récipient conformément aux exigences provinciales.
4. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou don't on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux cas de déversement ainsi que pour le nettoyage les déversements.

AVIS À L'UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi d'un tel produit dans des conditions dangereuses constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

AVIS À L'ACHETEUR: La garantie du vendeur est limitée et soumise aux conditions exprimées sur l'étiquette, de sorte que l'acheteur assume les risques corporels et matériels que l'utilisation ou la manipulation du produit peuvent entraîner et accepte celui-ci à cette condition.

NET: 10 kg

09/00